

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CEREZO

Temprana 13

Tamaño: Medio.

Forma: Cordiforme oval o semi-trapezoidal. Deprimida en la parte ventral y línea de polo a polo en la dorsal. Contorno oval-irregular.

Zona pistilar: Redondeada o bien levemente deprimida. **Punto pistilar:** Pequeño, casi imperceptible, situado sobre suave depresión, desviado generalmente hacia la sutura.

Sutura: Imperceptible por ser del mismo color que la chapa. Con frecuencia, desde la cavidad peduncular, en surco hasta cerca de su mitad.

Cavidad peduncular: Medianamente ancha, rebajada por ambas caras y a veces surco en el lado de la sutura. **Pedúnculo:** Largo, medianamente fino, ensanchado en sus extremos. Se desprende con facilidad.

Piel: Algo brillante. **Color:** Rojo a granate casi negro. Fondo rojo asalmonado e imperceptible. Punteado abundante, más denso hacia su cima, con o sin aureola oscura, entremezclados con otros cacarañados.

Carne: De color salmón entremezclado de rojo oscuro cerca del hueso. Semi-blanda. **Sabor:** Dulce, muy agradable.

Jugo: Abundante.

Hueso: Grande, oval o puntiagudo. Semi-adherido.

Maduración: Últimos de abril en Puente de la Sierra (Jaén).

